


Recordá:

La detección temprana tiene altas probabilidades de cura por eso consultá con tu médico ante cualquier síntoma, realizate el estudio de PAP periódicamente, utilizá preservativo ante nuevos contactos sexuales para evitar el contagio de otras enfermedades que predisponen al cáncer de cuello uterino.



Cáncer de Cuello Uterino

El cáncer de cuello de útero es el crecimiento celular anormal del cuello. El cuello es la parte inferior del útero o matriz. Es una enfermedad lenta, que puede producirse en la mujer a partir del momento en que comienza a tener relaciones sexuales. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de 30 a 55 años de edad. No se conoce una causa exacta que produzca esta enfermedad pero existen algunos factores que se han relacionado con la incidencia de esta enfermedad. El factor de riesgo más importante es la infección por papiloma virus (HPV). Otros factores son HIV, herpes genital, la promiscuidad sexual, la edad precoz de iniciación sexual, número de hijos elevados.

¿Cómo se detecta el cáncer de cuello del útero?

La detección primaria de cáncer de cuello de útero se hace por medio de una prueba de Papanicolaou (comúnmente llamado PAP). Una prueba de Papanicolaou, como parte de una exploración ginecológica (revisión) ayuda a detectar células anormales en el revestimiento del cuello antes de que puedan convertirse en células precancerosas o cáncer de cuello de útero. El PAP es un examen simple, rápido y no produce dolor. Este examen debe realizarse en forma anual a partir de que la mujer comienza a tener relaciones sexuales o en mayores de 18 años, independientemente del resultado del mismo.

¿Cuáles son sus síntomas?

Al comienzo de la enfermedad no se presentan síntomas pero se debe estar alerta si se presenta sangrado anormal entre las menstruaciones o luego de mantener relaciones sexuales o después de lavados vaginales.

